

tetesept:

Mariendistel Kapsel

Wirkstoff:

1 Weichkapsel enthält:
200 mg Trockenextrakt
aus Mariendistelfrüchten
(30–40:1)

Auszugsmittel:
Ethanol 96% V/V

Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss tetesept Mariendistel Kapsel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist tetesept Mariendistel Kapsel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel beachten?
3. Wie ist tetesept Mariendistel Kapsel einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist tetesept Mariendistel Kapsel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist tetesept Mariendistel Kapsel und wofür wird es angewendet?

tetesept Mariendistel Kapsel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:
Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel beachten?

2.1 tetesept Mariendistel Kapsel darf nicht eingenommen werden:

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Mariendistel und andere Korbblütler sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Soja, Erdnuss oder einen der sonstigen Bestandteile.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel ist erforderlich:
Dieses Arzneimittel ist ungeeignet für Personen mit Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz).

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankun-

gen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2.3 Bei Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel mit anderen Arzneimitteln ist Folgendes zu beachten:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

2.4 Bei Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

2.5 Schwangerschaft und Stillzeit:

tetesept Mariendistel Kapsel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

2.6 Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. tetesept Mariendistel Kapsel soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

2.7 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

2.8 Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von tetesept Mariendistel Kapsel:

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol.

Bitte nehmen Sie tetesept Mariendistel Kapsel daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist tetesept Mariendistel Kapsel einzunehmen?

Nehmen Sie tetesept Mariendistel Kapsel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
1 mal täglich 1 Kapsel

Art der Anwendung:

Nehmen Sie die Kapseln bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise einem Glas Wasser, vor dem Mittagessen ein.

Dauer der Anwendung:

Die Einnahmedauer ist nicht prinzipiell begrenzt, beachten Sie aber bitte die Angabe unter Punkt 2.2.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von tetesept Mariendistel Kapsel zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge tetesept Mariendistel Kapsel eingenommen haben, als Sie sollten:

Falls Sie dieses Arzneimittel versehentlich in höherer Dosierung eingenommen haben, kann eine leichte laxierende (abführende) Wirkung eintreten.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von tetesept Mariendistel Kapsel abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der

Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Einnahme des Präparates in der angegebenen Dosierung sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wurde tetesept Mariendistel Kapsel versehentlich in höherer Dosierung eingenommen, kann eine leichte laxierende (abführende) Wirkung eintreten.

Sojaöl kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist tetesept Mariendistel Kapsel aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. Blister angegebenen Verfalldatum „verwendbar bis“ nicht mehr verwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25°C lagern.

6. Weitere Informationen

Was tetesept Mariendistel Kapsel enthält:

Der Wirkstoff ist:

Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt

1 Weichkapsel enthält:

200 mg Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (30–40:1)

Auszugsmittel:

Ethanol 96 % V/V

Die sonstigen Bestandteile sind:

Maltodextrin, Gefälltes Siliciumdioxid, Phospholipide aus Sojabohnen, Sojaöl, Raffiniertes Kokosfett, Palmkernfett, Gelbes Wachs, Butterfett (von der Kuh), Gelatine, Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Chinolingelb (E104), Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172), Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält weniger als 0,1 BE.

Eine Weichkapsel enthält 23,48 mg Sorbitol (entspricht 5,87 mg Fructose).

Erhältliche Packungsgröße:

Originalpackung mit 24 Weichkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer:



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
60318 Frankfurt

Telefon: 069/15 03-1

Telefax: 069/15 03-200

Zulassungsinhaber:

Swiss Caps GmbH
Grassingerstrasse 9
83043 Bad Aibling

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt

Telefon: 069/15 03-1

Telefax: 069/15 03-200



Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2007 (Druck 04/2011)